



Farmaco da assumere: PICOPREP

Leggere attentamente il foglio illustrativo all'interno della confezione.

**Suggerimenti per la preparazione intestinale:**

**Nei 3 giorni precedenti l'esame** la dieta deve essere a basso residuo, cioè priva di scorie (eliminare frutta e verdura, legumi, frutta secca, alimenti integrali, ecc.).

**Il giorno prima dell'esame:**

- a colazione, consumare the zuccherato o nettare di frutta
- a pranzo, consumare solo brodo o semolino
- alle ore 8-9, sciogliere la prima dose ( ..... ) del prodotto Picoprep in 1 bicchiere di acqua e mescolare adeguatamente; attendere 2-3 minuti prima di assumere il prodotto mescolato; nelle 3-4 ore successive, bere da 1,5 a 2 litri di acqua o liquidi chiari (the o camomilla).
- dopo 6 ore dall'assunzione della prima dose, sciogliere la seconda dose (.....) del prodotto Picoprep in un bicchiere di acqua ed assumerla come da modalità precedenti, avendo cura di bere nelle 3-4 ore successive da 1,5 a 2 litri di acqua o liquidi chiari (the o camomilla).

**Posologia:**

1-2 aa: ¼ bustina la mattina + ¼ bustina il pomeriggio

2-4 aa: ½ bustina la mattina + ½ bustina il pomeriggio

4-9 aa: 1 bustina la mattina + ½ bustina il pomeriggio

≥ 9 aa: 1 bustina prima delle 8:00 + 1 bustina dopo 6-8 ore

**Diluizione:** ¼ di bustina in 50 ml di acqua

½ bustina in 75 ml di acqua

1 bustina in 150 ml di acqua

**Il giorno dell'esame:**

Il bambino deve rimanere a digiuno dai solidi dalla mezzanotte. Si possono somministrare liquidi chiari fino a circa 6 ore prima dell'esame.

I lattanti allattati al seno possono assumere il latte materno fino a 4 ore prima dell'esame.