



Per l'esecuzione dell'esame **PAP TEST** è necessario:

- PRIMA DI ESEGUIRE L'ESAME, OSSERVARE ALMENO 2 GIORNI DI ASTINENZA SESSUALE,
- ESEGUIRLO FRA IL 10° E IL 20° GIORNO DEL CICLO (IL PRELIEVO VA EFFETTUATO NEL PERIODO COMPRESO TRA I 3-5 GIORNI CHE SEGUONO IL TERMINE DELLE MESTRUAZIONI ED I 3-5 GIORNI CHE PRECEDONO L'INIZIO DEL FLUSSO MESTRUALE),
- NEI 3 GIORNI CHE PRECEDONO L'ESAME, EVITARE L'APPLICAZIONE DI CREME, OVULI, IRRIGAZIONI VAGINALI.

L'ESAME PUÒ ESSERE ESGUITO ANCHE IN GRAVIDANZA, SENZA PROBLEMI PER IL FETO E LA GESTANTE (L'ESAME VA ESEGUITO QUALORA CI SIA UNA REALE MOTIVAZIONE E LA GESTANTE DEVE FIRMARE IL CONSENSO ALL'ESAME).

L'ESAME PUÒ ESSERE ESEGUITO ANCHE IN PAZIENTI SOTTOPOSTE AD ISTERECTOMIA; IL PRELIEVO VA EFFETTUATO SU CUPOLA VAGINALE.